



## FREDOLIC

Castellà: **Ratón, negrilla**; basc: **Ziza arre**; francès: **Petit gris**; italià: **Cavarese**; anglès: **Grey agaric**; alemany: **Erdritterling, Grauer E**

**Durant les tardors fredes, als matins és molt freqüent trobar un bonic paisatge blanc, amb una fina capa de gebrer que recobreix els camps. Les baixades de temperatura nocturnes que causen aquestes gebrades generen les condicions òptimes perquè fongs com el fredolic fructifiquin.**

El fredolic creix sota els pins, normalment formant grups nombrosos, i, més rarament, sota les estepes. És un bolet indiferent a la naturalesa del sòl i fructifica entre els mesos de setembre i gener, encara que és més abundant a finals de la tardor. El barret pot arribar a mesurar 8 cm de diàmetre, tot i que les mides habituals són de 3 cm a 5 cm; és una mica convex de bon principi, amb una protuberància o umbó al centre que gairebé sempre es manté en la maduresa.

### Superfície finament esquamosa i de color gris fosc

La superfície del barret és seca i està recoberta per petites esquames de color gris. El barret generalment és de color gris fosc, gairebé negre al centre i una mica més clar al marge, encara que també es troben exemplars de color gris clar. Les làmines estan una mica separades i són molt sinuades (tenen una depressió en arribar al peu); tenen un color molt més pàl·lid que el del barret, d'una tonalitat blanca grisosa característica. La cama és llarga, cilíndrica, més estreta a la base i generalment llisa. La carn del fredolic és molt fràgil i trencadissa, de color gris. L'olor que desprèn és neutra; el sabor no és remarcable.

**NO CONFONDRE AMB EL FREDOLIC BORD.** La confusió amb aquest bolet tòxic és poc probable però cal anar amb compte. Es diferencia pel port, molt més robust que el fredolic; per la carn poc fràgil i amb olor de farina; per tenir les esquames més destacades, i per viure en llocs elevats, sobretot a les avetoses.

*Tricholoma terreum*

Ordre: *Tricholomatales* Família: *Tricholomataceae*

Època: Setembre, octubre, novembre  
desembre i gener

Hàbitat: Pineda i estepar

Abundància: Força freqüent

Altitud: 10-2.000 m

Comestible: Excel·lent



### SABIES QUE...?

La resta de noms populars que s'atorguen al fredolic (com ara negret i brunet) fan referència al color fosc del seu barret, pràcticament negre.



El barret és gris negrós, amb fibril·les o esquames fines

Les làmines van del color blanc al grisós pàl·lid

La cama és de color blanc grisós

Les làmines són sinuades i no arriben a la cama